Dolore toracico

PAZIENTE CHE RIFERISCE DOLORE TORACICO O SINTOMATOLOGIA EQUIVALENTE (Dolore alla mandibola, spalla, arto superiore, interscapolare, epigastrico; dispnea non altrimenti spiegabile in atto o anamnestica; sincope; palpitazioni; stato di shock non traumatico; presenza di segni neurovegetativi)

Somministra O2, Pulsossimetria, Monitor

ENTRO 10 MIN DAL CONTATTO MEDICO

ECG a 12 deriv.
(Richiedi un pregresso tracciato per un eventuale confronto)

Anamnesi
- Natura dell'attuale episodio e tempo d'insorgenza
- Fattori di rischio cardiovascolare(Pregresso IMA, Ipertensione, dislipidemie, fumo, diabete, familiarità, pregressi eventi cardiovascolari ed eventuali pregresse procedure di rivascolarizzazione)

Esame obiettivo
- Valuta lo stato emodinamico e la perfusione periferica
- Palpa I polsi periferici per una eventuale asimmetria
- Auscultazione polmonare
- Auscultazione cardiaca
- Considera diagnosi alternative(dolore parietale, processo broncopneumonico, embolia polmonare, reflusso gastroesofageo, etc)

ASA 125-325 mg P.O./500 mg I.V *

DIAGNOSI ECG

Elevazione del tratto ST o Nuovo/presumiblilmente nuovo BBS o Segni di Infarto della parete posteriore

- Nitrati SL/EV
- Morfina cloridrato EV

Eparina sodica non frazionata EV

Clopidogrel POS

Dal 1° Contatto medico al pallone entro 90 min

Centralizzazione per PTCA primaria*

Alterazioni ischemiche ECG non STE

- Nitrati SL/EV
- Morfina cloridrato EV

- **Shock cardiogeno in pazienti senza controindicazioni alla rivascolarizzazione (CLASSE I *Livello di evidenza: B*)**
- **Scompenso cardiaco congestizio grave e/o edema polmonare (Classe III di Killip) (CLASSE I *Livello di evidenza: B*)**
- **Aritmie ventricolari con compromissione emodinamica (CLASSE I *Livello di evidenza: C*)**

SI → **Centralizzazione per PTCA primaria***

NO → Trasporto verso l'ospedale di zona per ulteriore percorso diagnostico/terpeutico

Considera nei pazienti ad alto rischio

Clopidogrel POS

Eparina sodica non frazionata EV

ECG Non Diagnostico

- Nitrati SL/EV
- Morfina cloridrato EV

Trasporto verso l'ospedale di zona per ulteriore percorso diagnostico/terapeutico